

# Posologie chez l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans



## 1 fine couche de crème

sur les zones dépigmentées de la peau



## 2 fois par jour



## 8 heures d'intervalle minimum

entre deux applications d'Opzelura®.



10x

## Sur maximum 10 % de la surface corporelle

soit 10 fois la paume d'une main avec les 5 doigts.

Opzelura® doit être utilisée sur la plus petite zone de peau nécessaire.<sup>1</sup>



**2 heures d'intervalle minimum** avant l'application d'autres topiques :

- Médicaments pour autres affections sur les mêmes zones.
- Écran solaire.
- Émoullients.



Il est préférable de ne pas laver la peau traitée pendant **au moins 2 heures après l'application.**



Ne pas utiliser plus de deux tubes de 100 grammes **par mois.**



La durée de conservation est de **6 mois après ouverture.**  
À conserver à une température ne dépassant pas 30° C.



L'obtention d'une repigmentation satisfaisante peut nécessiter un traitement de plus de 24 semaines.

Si les zones traitées présentent moins de 25 % de repigmentation à **52 semaines de traitement**, l'interruption du traitement devrait être envisagée.

# Durée d'utilisation d'Opzelura®<sup>1</sup>



Il est important de noter que la réponse thérapeutique peut **varier considérablement** d'une personne à l'autre. En effet, dans les études cliniques, une repigmentation progressive des lésions sur le visage et le corps a été observée après une période de 1 an.<sup>3</sup>

Les patients recevant un traitement contre le vitiligo doivent être informés que la repigmentation est **progressive**, nécessite de la **persistance** et peut se produire avec plus de succès dans les zones contenant des follicules pileux.<sup>2,3,4</sup>

Il est donc recommandé d'appliquer la crème Opzelura® **deux fois par jour** et de façon **continue**, afin d'obtenir le meilleur résultat thérapeutique.

## Précautions d'emploi\*\*<sup>1</sup>

- ❖ **Ne pas utiliser la crème si vous êtes allergique** au ruxolitinib (l'ingrédient actif d'Opzelura®) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament ou si vous êtes **enceinte** ou **que vous allaitez**.
- ❖ **Opzelura® n'est pas destiné à être utilisé sur les lèvres, les yeux, la bouche, ou le vagin.** Lavez immédiatement avec beaucoup d'eau en cas de contact accidentel sur l'une des zones.



[www.uncovervitiligo.be](http://www.uncovervitiligo.be)

Scannez le QR code pour plus d'informations sur le vitiligo

\*\*Ne pas conserver à une température supérieure à 30° C. Utiliser dans les 6 mois suivant la première ouverture (durée de conservation : 21 mois non ouvert). \*\*Pour signaler un événement indésirable ou pour toute information médicale, veuillez envoyer un e-mail à [euminfo@incyte.com](mailto:euminfo@incyte.com) ou contacter le Call Center Incyte (24h/24 et 7j/7) : numéro gratuit : + 800 000 27423 ou tarif local : +32 2 401 91 67

1. Opzelura® (ruxolitinib) [Summary of Product Characteristics \[ema.europa.eu\]](https://www.ema.europa.eu). Incyte Biosciences International Sarl. August 2025.  
2. Bergqvist C, Ezzedine K, J Dermatol. 2021;48(3):252–270. 3. Rosmarin D, et al. N Engl J Med. 2022;387(16):1445–1455. 4. Birlea SA, et al. Dermatol Clin. 2017;35(2):205–218.